

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нистатин

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Нистатин

Международное непатентованное или группировочное наименование: нистатин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав.

Действующее вещество:

Нистатин - 2,222 г

Вспомогательные вещества:

ланолин безводный - 40,000 г

вазелин - до 100 г

Описание: однородная мазь от желтого до буровато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство

Код АТХ: D01AA01

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик. Обладает противогрибковой (фунгистатической и фунгицидной) активностью. Имеет в структуре большое количество двойных связей, обуславливающих высокую тропность вещества к стеринным образованиям цитоплазматической мембраны грибов. Вследствие этого молекула встраивается в мембрану клетки с образованием множества каналов, способствующих неконтролируемому транспорту воды, электролитов и неэлектролитов. Клетка теряет устойчивость к воздействию внешних осмотических сил и лизируется. Резистентность развивается очень медленно. Активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida* и аспергиллы. Оказывает фунгистатическое, а в больших дозах – фунгицидное действие.

Фармакокинетика

Не всасывается с поверхности кожи.

Показания к применению

Лечение и профилактика кандидоза кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение при беременности возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка, только после консультации с лечащим врачом.

Период грудного вскармливания

Возможно применение препарата в период грудного вскармливания (нистатин не всасывается с поверхности кожи), исключая область молочных желез, только после консультации с лечащим врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи 2 раза в день, возможно применение в виде повязки, накладываемой на 12-24 ч. Курс лечения – 10-14 дней.

Побочное действие

Кожный зуд, высыпания, лихорадка, озноб, аллергические реакции.

Передозировка

Ввиду того что препарат не всасывается с поверхности кожи, вероятность передозировки исключена. Случаев передозировки нистатина не зафиксировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении нистатина с клотримазолом активность последнего снижается.

Особые указания

Применение мази можно сочетать с приемом нистатина внутрь.

Если во время и после нанесения мази на коже проявилась аллергическая реакция, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять автотранспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 100 000 ЕД/г.

По 10, 15 или 30 г в тубе алюминиевой.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.